



Classe des Agaricomycetes
Ordre des Agaricales
Famille des Fistulinacés


La Langue de bœuf (*Fistulina hepatica*)

Niveau Confirmé

Où le chercher en France?



Quand le chercher ?



Où le chercher en forêt ?

- De l'été à l'automne, il apprécie les blessures d'arbres feuillus tels que les chênes et parfois les châtaigniers
- Sur bois parfaitement vivant

Pourquoi le chercher ?

- Améliorer la connaissance sur la répartition de l'espèce dans ces départements

UICN France : Non évalué



Description

- Chapeau de 7 à 25 cm de large en forme de console ou de langue
- Surface visqueuse, couverte de petites aspérités
- Couleur rouge brique, devenant plus foncée en vieillissant
- Face inférieure présentent des pores de couleur crème qui s'assombrissent rapidement lorsqu'ils sont blessés
- Peut exsuder un jus couleur sang
- Parfois pied court fixé sur le support

Caractères biologiques

Habitat

Pas très commun, mais présent sur tout le territoire métropolitain. Il pousse dans les bois de plaine et moyenne montagne, très rarement en montagne

L'Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences participatives ouvert à tous ! Il a pour but d'obtenir, en France métropolitaine, des données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour compléter l'Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : <https://biodiversite-foret.fr/observatoire/2-comment-participer/>