




Classe des Insectes  
Ordre des Lépidoptères  
Famille des Nymphalidés

Niveau Débutant

## Où le chercher en France?



## Quand le chercher ?



## Où le chercher en forêt ?

- Lisières forestières
- À proximité des cours d'eau
- En surplomb rocheux
- Posé sur du lierre feuillu ou en-dessous d'arbres tombés


## Pourquoi le chercher ?

- Améliorer la connaissance sur la répartition de l'espèce dans ces départements

**UICN France :** (Préoccupation mineur)

L'Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences participatives ouvert à tous ! Il a pour but d'obtenir, en France métropolitaine, des données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour compléter l'Inventaire National du Patrimoine Naturel.  
Pour participer : <https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/>

## Le Morio (*Nymphalis antiopa*)



### Description

- Grand papillon pouvant atteindre 75 mm d'envergure
- Dessus des ailes violet foncé présentant une bande marginale jaune (blanche après hibernation) et une série de taches marginales bleues
- Dessous des ailes noir avec la même bande marginale jaune

### Caractères biologiques

#### Habitat

Partout en France jusqu'à 2000m d'altitude, forêts de bouleaux et de saules, vallées de rivières, vallons rocheux, dunes et landes sèches et humides.

#### Plantes hôtes

Essentiellement des saules et des bouleaux, notamment le Saule blanc et le Saule gris. Plus rarement, la chenille se nourrit d'ormes et peupliers.

#### Alimentation

Exsudations (sève et autres) issues des plaies des arbres, fruits tombés.

#### Reproduction

Les œufs sont pondus autour des fines brindilles du futur arbre nourricier, en forme d'un manchon de 20 à 25 mm de longueur. La ponte peut compter plus de 200 œufs.

#### Période de vol

De mai à juillet en une génération annuelle. Les Morio qui ont hibernés réapparaissent de mars à juin.