



Classe des Agaricomycetes
Ordre des Polyporales
Famille des Fomitopsidacés


Le Polypore marginé (*Fomitopsis pinicola*)

Niveau Débutant

Où le chercher en France?



Quand le chercher ?



Où le chercher en forêt ?

- Sur les souches, troncs et branches mortes
- Principalement sur bois de conifères mais aussi sur feuillus

Pourquoi le chercher ?

- Améliorer la connaissance sur la répartition de l'espèce dans ces départements

UICN France : Non évalué



Description

- Chapeau de 3 à 10 cm de large, en forme de sabot de cheval ou en console
- Irrégulièrement bosselé, de couleur allant du jaune orangé à rouge orangé
- Partiellement ou presque entièrement couvert d'une croûte vernissée foncée
- La face supérieure du champignon est constituée par l'addition de couches successives d'abord jaunâtre, puis grisâtre et orange
- Le bord du chapeau est plus clair que le reste
- Lorsque le champignon est en croissance, l'hyménium (face inférieure fertile) suinte des gouttelettes
- Les pores (3 à 4 mm) sont arrondis et de couleur jaune crème
- Pas de pied
- On trouve cette espèce tout au long de l'année

Caractères biologiques

Habitat

Très commun en France, il est présent dans tous les types de forêts, de la plaine jusqu'à la moyenne montagne

L'Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences participatives ouvert à tous ! Il a pour but d'obtenir, en France métropolitaine, des données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour compléter l'Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : <https://biodiversite-foret.fr/observatoire/2-comment-participer/>