




Classe des Insectes
Ordre des Coléoptères
Famille des Cérambycidés

Niveau Débutant

Où le chercher en France?



Quand le chercher ?



Où le chercher en forêt ?

- Généralement sur le bois mort (tas de bûches et troncs)
- Egalement sur les fleurs (surtout des ombellifères : Fenouil commun, Grande Astrance, Cerfeuil sauvage, Angélique de Razouls, etc.) et les arbustes

Pourquoi le chercher ?

- Améliorer la connaissance sur la répartition de l'espèce dans ces départements

UICN France : **LC** (Préoccupation mineur)

L'Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences participatives ouvert à tous ! Il a pour but d'obtenir, en France métropolitaine, des données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour compléter l'Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : <https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/>

Le Clyte bélier (*Clytus arietis*)



Description

- De 8 à 14 mm de long
- Elytres très courts de couleur noir alternant avec des bandes jaunâtres
- Bande jaune en « V » sur les élytres
- Pronotum (segment du thorax situé derrière la tête) noir et de forme carrée
- Pattes longues de couleur jaune-orangé, avec les fémurs plus sombres
- Antennes noires avec les premiers articles roux

Caractères biologiques

Habitat

Commun dans toute la France, se rencontre dans les lisières de bois, les chemins forestiers, les clairières, là où l'on peut trouver du bois mort. Egalement floricole, fréquente particulièrement les ombellifères

Alimentation

Nectar et pollen

Reproduction

- En été
- Après la reproduction, les femelles pondent dans l'écorce de bois mort
- Les larves s'y développent pendant 2 ans avant de se nymphoser