





Classe des Agaricomycetes
Ordre des Polyporales
Famille des Polyporacés

Niveau Débutant

Où le chercher en France?



Quand le chercher ?



Où le chercher en forêt ?

- Il parasite principalement le tronc et les branches du hêtre, plus rarement sur d'autres feuillus
- Bouleau, aulne, peuplier, saule, marronnier, platane
- De manière exceptionnelle sur les résineux

Pourquoi le chercher ?

- Améliorer la connaissance sur la répartition de l'espèce dans ces départements

UICN France : Non évalué

L'Amadouvier (*Fomes fomentarius*)



Description

- Chapeau de 10 à 40 cm de large, en forme de sabot de cheval ou de console
- Bossu au sommet, gravé de sillons concentriques formant entre eux des bourrelets plus amples au début, puis plus étroits avec l'âge.
- Couleur jaunâtre, brun-rouge, brunissant vers son point d'attache et s'éclaircissant vers le bord du chapeau
- Pores très fins, blancs, puis crème et roussissent avec l'âge
- Pas de pied
- Espèce pérenne (reste en place plusieurs années), et reprend sa croissance au début du printemps
- Jeunes amadouvières dégagent une odeur de banane

Caractères biologiques

Habitat

Il est présent sur tout le territoire métropolitain, dans les bois de plaine et moyenne montagne. Habitat préférentiel est la hêtraie

L'Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences participatives ouvert à tous ! Il a pour but d'obtenir, en France métropolitaine, des données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour compléter l'Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : <https://biodiversite-foret.fr/observatoire/2-comment-participer/>